

TURVAC-OIL ŞAP AŞISI PROSPEKTÜSÜ

"Sadece VETERİNER Kullanım İçindir"

1. Kompozisyonu

BHK₂₁ süspansiyon hücre kültürlerinde üretilen, BEI ile inaktive edildikten sonra konsantre edilen şap aşısı antijenlerinden oluşmaktadır. Doz başına en az 3 PD₅₀ antijen içerir. Adjuvant olarak yağ adjuvantı (Montanide ISA-206), koruyucu olarak da doz başına 20-30 ppb Thiomerosal ilave edilmiştir.

2. Endikasyonlar

Siğir, manda, koyun, keçi ve domuzlarda şap hastalığına karşı kullanılır.

3. Kontraendikasyonlar

Herhangi bir kontraendikasyonu bulunmamaktadır.

4. Uygulama Şekli

Aşılama siğir, manda, koyun ve keçilere derin kas içi veya deri altı yolla boyuna veya gerdana yapılır. Domuzlara ise derin kas içi yolla boyuna yapılır. Kullanılmadan önce hafif çalkalanarak homojen hale getirilmelidir (Bekletildiğinde aşısı yüzeyinde yağ tabakası oluşması veya dipte bir miktar ayrışma normaldir).

5. Doz

Siğir – Manda : 2 ml
Koyun - Keçi : 1 ml
Domuz : 2 ml

6. Aşılama Programı

1. aşılama

Aşısız annelerden doğan yavrulara 2 haftalıktan, aşılan annelerden doğan ve yaşamının ilk günlerinde kolostrum alan yavrulara ise 2 aylıktan itibaren ilk aşılama

Rapel aşılama

1. aşılama 1 ay sonra

Takip eden aşılama

1. ve rapel aşılması yapılan hayvanlara her 6 ayda bir aşılama yapılmalıdır. Ancak hastalığın yoğun olarak görüldüğü bölgelerde etkin bir koruma sağlamak için 4 ayda bir aşısı yapılması tavsiye edilir.

Mihrak aşılama

Salgın söz konusu olduğunda çevre aşılması, aşılama geçmişine bakılmaksızın 2 haftalıktan büyük tüm duyarlı hayvanlara yapılmalıdır.

7. Uyarılar

- Aşılar sağlıklı hayvana asepsi kurallarına dikkat edilerek uygulanmalıdır.
- Aşılar gebe hayvanlarda güvenle (uygun zapt-ı rapt ve stres faktörlerinden kaçınmak şartıyla) kullanılabilir.
- Aşılama aşısı şişeleri 8 saat içerisinde steriliteye dikkat edilerek kullanılmalıdır.
- Aşısı uygulamaları otomatik şırıngalar ile yapılmamalıdır.
- Aşısı şişeleri sıcaktan ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.
- Aşının yanlışlıkla uygulayıcıya enjekte edilmesi durumunda lokal bir reaksiyon görülebilir. Bu durumda doktora başvurulmalı, aşının inaktif olduğu ve yağ adjuvantı içerdiği söylenmelidir.

8. Yan Etkileri

Aşılama yerinde şişlik, hafif ateş, iştahsızlık ve süt veriminde azalma gibi reaksiyonlarının yanında bütün aşılarda olduğu gibi hipersensitivite reaksiyonları görülebilir. Aşılama ekipleri antikolinerjik ilaçlar, solunum ve dolaşım analeptikleri ve antihistaminik ilaçları yanında bulundurulmalı ve aşılama mahallini hemen terk etmemelidir.

9. Yasal Arınma Süresi

Arınmaz.

10. Saklama Koşulları

+2 °C - + 8 °C'de saklanmalı ve nakledilmelidir.

11. Ambalaj Şekli

Monovalan veya polivalan olarak hazırlanır. Aşılar koyu renkli cam şişelerde 50 ml hacminde kullanıma sunulur.

12. İmha Şartları

İmhası gereken durumlarda aşılar Şap Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderilmelidir

13. Üretici Firma Adresi

Şap Enstitüsü Müdürlüğü
Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 35
Çankaya/ANKARA

Yazışma Adresi:

Şap Enstitüsü Müdürlüğü P.K. 714
06044 Ulus/ANKARA
Tel : 0312 287 36 00 • Faks : 0312 287 36 06
web : www.sap.gov.tr • e-mail : bilgi@sap.gov.tr